

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее - Минздрав) информирует о том, что в настоящее время результаты дозорного и рутинного слежения демонстрируют выраженный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (далее – ОРИ) и гриппом во всех регионах страны. Так, с конца января 2024 г. заболеваемость населения ОРИ, по сравнению с началом января, возросла более чем на 35%, на долю детского населения приходится более 60% от всех заболевших.

В соответствии с данными лабораторного мониторинга активная циркуляция вирусов гриппа началась с середины января текущего года. В настоящее время в структуре возбудителей респираторных инфекций на долю вирусов гриппа приходится около 50% от всех положительных образцов биоматериала. Помимо вирусов гриппа отмечается циркуляция негриппозных респираторных вирусов (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2, и другие).

В ближайшее время ожидается прирост заболеваемости на 10-15% за неделю с увеличением числа обращений в организации здравоохранения по поводу острой респираторной вирусной патологии.

С целью ограничения распространения ОРИ и гриппа среди населения Минздрав предлагает:

1. использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и других в соответствии с характером и особенностями выполняемой работы и законодательством;

2. проведение ежедневной влажной уборки помещений, контактных поверхностей, предметов, используемых широким кругом лиц, с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов и разрешенных к применению для этих целей, в соответствии с инструкциями по применению средств; обеззараживание воздушной среды;

3. эффективное функционирование вентиляционных систем фрамуг, форточек и иных устройств, для проветривания помещений;

4. создание условий для соблюдения социальной дистанции между работниками и посетителями организаций здравоохранения;

5. наличие условий для соблюдения гигиены рук работниками и посетителями с использованием дезинфицирующих средств для обработки рук или антисептических средств для кожи рук, в том числе с помощью установленных дозаторов, в соответствии с инструкциями по применению;

6. при заболеваниях ОРИ лучше вызвать врача на дом.