

Регистрация кори продолжается

Чем опасна корь?

Корь – очень заразное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, общей интоксикацией, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательный путей, а также сыпью.

У непривитых детей корь протекает тяжело: с длительной лихорадкой и высокой вероятностью осложнений, среди которых – пневмония, энцефалит.

Последствия перенесенной инфекции могут проявиться и через 6–10 лет в виде поражения головного мозга и вызывает умственную деградацию, конвульсии, судороги.

В областях Республики Беларусь начиная с 2023 года, продолжается регистрация случаев кори.

В течение 2023 в Витебской было зарегистрировано 16 случаев заболевания корью. Возникновение случаев заболевания регистрировались преимущественно среди лиц, у которых отсутствуют сведения о проведенной вакцинации. Из общего числа заболевших корью – 75% не были привиты и не знают свой прививочный статус.

Методов специфического лечения кори не существует. А вот предотвратить заболевание можно при помощи вакцинации, как самого безопасного и эффективного способа защиты.

Вакцины против кори обладают высокой эффективностью. После введения одной дозы вакцины, содержащей коревой компонент, у более чем 95% привитых формируется долговременная иммунная защита организма, после введения второй дозы эффективность достигает практически 100%. Таким образом, для обеспечения длительной защиты требуется 2 дозы вакцины.

В Республике Беларусь вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок, утвержденному постановлением Министерства здравоохранения от 17.05.2018 № 42 «О профилактических прививках», и состоит из 2 профилактических прививок в возрасте 12 месяцев и 6 лет.

Всем взрослым (от 18 лет и старше) рекомендуется:

- уточнить свой прививочный статус против кори в организации здравоохранения;

- **сделать профилактические прививки против кори** если отсутствуют документальные сведения о вакцинации против кори, о перенесенной кори, о результатах серологического исследования крови, подтверждающего наличие защитных уровней IgG-антител к вирусу кори, или если имеются документальные сведения только об одной профилактической прививке против кори.