

Приложение 5
к информационному листу (памятке)
о применении требований к качеству
и калибровке плодоовощной
продукции, поставляемой для
республиканских государственных
нужд

Требования к **картофелю** продовольственному
(ГОСТ 7176-2017 «Картофель продовольственный. Технические
условия»)

Качество продовольственного картофеля должно соответствовать характеристикам и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма для картофеля	
	раннего	позднего
Внешний вид	<p>Клубни целые, чистые, свежие, здоровые, покрытые кожурой, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, не позеленевшие, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла.</p> <p>Допускаются клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 см², которые могут быть удалены при обычной очистке.</p> <p>Допускаются клубни с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм.</p> <p>Допускаются клубни, пораженные паршой, ооспорозом на площади не более 1/4 поверхности клубня, в том числе наличие пятен глубокой обыкновенной картофельной парши и порошистой парши глубиной не более 2 мм.</p> <p>Допускаются клубни, пораженные проволочником (при наличии не более одного хода).</p>	
	Клубни, покрытые кожурой Допускаются клубни с неокрепшей кожурой и ее частичное отсутствие	Клубни, полностью покрытые плотной кожурой
Вид внутренней части клубня	Типичная для ботанического сорта окраска. Пятна ржавой (железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная	Типичная для ботанического сорта окраска. Пятна ржавой (железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и

	сердцевина и другие внутренние дефекты не допускаются	другие внутренние дефекты не допускаются
Запах и вкус	Свойственный данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса	
Массовая доля клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм; повреждения сельскохозяйственными вредителями (проволочником более одного хода) в совокупности, %, не более	2,0	
Массовая доля клубней с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 см ² , но не более 1/4 поверхности клубня, в совокупности, %, не более	2,0	
Массовая доля клубней, пораженных паршой или ооспорозом при поражении более 1/4 поверхности клубня, %, не более	Не допускается	2,0
Массовая доля посторонней примеси, %, не более в том числе земли, прилипшей к клубням	1,0	2,0
	Не допускается	1,0
Наличие клубней, позеленевших на площади более 1/4 поверхности, поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, с признаками «удушья», клубней раздавленных, половинок и частей клубня, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой	Не допускается	
Массовая доля клубней, не соответствующих требованиям, %, не более в том числе:	4,0	6,0

– серые, синие или черные пятна под кожурой, глубиной не более 5 мм	4,0	6,0
– пораженные ржавой (железистой) пятнистостью	Не допускаются	2,0
* Сортная чистота должна быть не менее 90 %.		

Показатель «массовая доля клубней, не соответствующих требованиям, %, не более» регламентирует допустимую массовую долю клубней картофеля с серыми, синими или черными пятнами и под кожурой, глубиной не более 5 мм, а также пораженных ржавой (железистой) пятнистостью, в % от общей массы клубней в объединенной пробе для картофеля разных сроков созревания:

для раннего картофеля допускается наличие клубней, имеющих серые, синие или черные пятна под кожурой, глубиной не более 5 мм, массовая доля которых от общей массы не превышает 4 % и не допускается наличие клубней, пораженных ржавой (железистой) пятнистостью;

для позднего картофеля допускается наличие клубней с серыми, синими или черными пятнами под кожурой, глубиной не более 5 мм, массовая доля которых от общей массы не превышает 6 %; допускается наличие клубней с ржавой (железистой) пятнистостью, массовая доля которых от общей массы не превышает 2 %, при этом суммарная массовая доля клубней с указанными дефектами (серые, синие, черные пятна под кожурой, глубиной не более 5 мм, ржавая пятнистость) не должна превышать 6 % от общей массы.

Клубни продовольственного картофеля калибруют по размеру, определяемому прохождением через квадратные отверстия.

Размер клубней должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

Требования к калибровке продовольственного картофеля не являются обязательными, за исключением поставляемого в рамках государственного заказа. Однако в потребительских упаковочных единицах массой продовольственного картофеля не более 5 кг разница между размерами самого мелкого и самого крупного клубня не должна быть более 30 мм.

Наименование показателя	Значение показателя
Наименьший размер квадратных отверстий, через которые не должны проходить клубни, мм:	
– для раннего картофеля	28,0 × 28,0
– для позднего картофеля	35,0 × 35,0
– для позднего картофеля, поставляемого в рамках государственного заказа	45,0 × 45,0
– для картофеля удлиненной формы*	30,0 × 30,0
– для картофеля удлиненной формы, поставляемого в рамках государственного заказа	40,0 × 40,0

<p>Наибольший размер квадратных отверстий, через которые должны проходить клубни, мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для раннего картофеля – для позднего картофеля – для картофеля удлиненной формы* 	<p>80,0 × 80,0</p> <p>80,0 × 80,0</p> <p>75,0 × 75,0</p>
<p>Массовая доля клубней, не соответствующих требованиям по калибровке**, %, не более</p>	<p>10,0</p>
<p>* Требования к размеру клубней не распространяются на картофель ботанических сортов удлиненной формы, с неправильной формой клубня (например, Stella, Ratte или Pink Fir Apple).</p> <p>** Допускается наличие клубней, размеры которых превышают максимальный размер, при условии, что разница между самым мелким и самым крупным клубнями не превышает 30 мм.</p>	